

## KULLANMA TALİMATI

### VERXANT 300 mg/2 mL Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem

Deri altı enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Steril

- **Etkin madde:** Her bir kullanıma hazır enjeksiyon kalemi, 2 ml içinde 300 mg secukinumab içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Trehaloz dihidrat, histidin, histidin hidroklorür monohidrat, metiyonin, polisorbat 80, enjeksiyonluk su

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **VERXANT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VERXANT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VERXANT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VERXANT'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. VERXANT nedir ve ne için kullanılır?**

VERXANT, kullanıma hazır enjeksiyon kalemi içinde enjeksiyonluk çözüldür. Çözüldü berrak ve renksiz ila hafif sarıdır. VERXANT, 1 kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içeren paket halinde takdim edilmektedir.

VERXANT, secukinumab etkin maddesini içerir. Secukinumab, bir monoklonal antikordur. Monoklonal antikordur, vücutta belirli proteinleri tanıyan ve bunlara bağlanan proteinlerdir.

VERXANT, interlökin (IL) inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaç, IL-17A adı verilen ve sedef hastalığı (psoriasis), sedef hastalığına bağlı eklem hastalığı (psoriatik artrit) ve başta omurga eklemlerini etkileyen eklem rahatsızlığı (ankilozan spondilit) gibi hastalıklarda yüksek düzeylerde bulunan bu proteinin aktivitesini nötrleştirmek suretiyle etki gösterir.

VERXANT aşağıda yer alan inflamatuvar hastalıkların tedavisinde kullanılır:

- Plak psoriasis
- Psoriatik artrit
- Ankilozan spondilit

### **Plak psoriasis**

VERXANT, "plak psoriasis" adı verilen, deriyi etkileyen enflamasyona neden olan bir deri hastalığının tedavisinde kullanılır. VERXANT, iltihabı ve hastalığın diğer semptomlarını azaltır. VERXANT, orta dereceli ila şiddetli plak psoriasis hastası yetişkinlerde kullanılır.

Plak psoriasisde VERXANT kullanmanız, derideki hastalıklı tabakanın uzaklaştırılmasını sağlayarak ve pullanma, kaşıntı ve ağrı gibi semptomlarınızı azaltarak size fayda sağlayacaktır.

### **Psoriatik artrit**

VERXANT, "psoriatik artrit" adı verilen bir hastalığın tedavisinde kullanılır. Bu durum, eklemlerin iltihaplı bir hastalığı olup bu hastalığa sıklıkla psoriasis eşlik etmektedir. Eğer siz de aktif psoriatik artrit varsa size ilk olarak başka ilaçlar verilecektir. Eğer bu ilaçlara iyi yanıt vermezseniz, aktif psoriatik artrit bulgu ve belirtilerini azaltmak, fiziksel işlevi iyileştirmek ve hastalığın etkilediği eklemlerin kıkırdaklarında ve kemiklerinde hasarı yavaşlatmak için size VERXANT verilecektir.

VERXANT, aktif psoriatik artrit hastası yetişkinlerde kullanılır ve tek başına ya da metotreksat adlı başka ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

VERXANT'ı psoriatik artritte kullanmak size hastalığın bulgu ve belirtilerini azaltmak, hastalığın etkilediği eklemlerin kıkırdaklarında ve kemiklerinde hasarı yavaşlatmak ve normal günlük aktiviteleri yapma becerinizi artırmak suretiyle fayda sağlayacaktır.

### **Ankilozan spondilit**

VERXANT, "ankilozan spondilit" adı verilen bir hastalığın tedavisinde kullanılır. Bu durum, iltihaplı bir hastalık olup temelde omurgayı etkiler ve omurga eklemlerinde iltihaba yol açar. Eğer sizde ankilozan spondilit varsa size ilk olarak başka ilaçlar verilecektir. Eğer bu ilaçlara iyi yanıt vermezseniz, hastalığın bulgu ve belirtilerini azaltmak, iltihabı azaltmak ve fiziksel işlevi iyileştirmek için size VERXANT verilecektir.

VERXANT, aktif ankilozan spondilit hastası yetişkinlerde kullanılır.

VERXANT'ı ankilozan spondilitte kullanmak size hastalığın işaret ve belirtilerini azaltmak ve fiziksel işlevinizi düzeltmek suretiyle fayda sağlayacaktır.

## 2. VERXANT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### VERXANT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:

- Secukinumaba ya da VERXANT'ın diğer içerik maddelerine karşı **alerjiniz varsa**, Alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, VERXANT'ı kullanmadan önce doktorunuzun tavsiyesini alınız.
- Doktorunuzun önemli olduğunu düşündüğü, **aktif bir enfeksiyonunuz varsa**.

Yukarıda belirtilen durumlar sizin için geçerliyse, doktorunuza durumunuzu bildirin.

Böyle bir durumda VERXANT kullanmamalısınız.

### VERXANT'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:

- Halen bir enfeksiyonunuz varsa.
- Uzun süredir devam eden veya tekrarlayan enfeksiyonlarınız varsa.
- Tüberkülozunuz varsa.
- Crohn hastalığınız (bağırsakların kronik iltihaplı bir hastalığı) varsa.
- Ülseratif kolitiniz (bağırsakların kronik iltihaplı bir hastalığı) varsa.
- Yakın zamanda size aşı yapıldıysa ya da VERXANT ile tedaviniz sırasında aşı olacaksınız.
- Psoriasis için başka tedavi alıyorsanız; örn., bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlar (siklosporin, metotreksat, TNF blokeri ajanlar) veya morötesi (UV) ışık ile fototerapi.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### Hepatit B

Hepatit B enfeksiyonunuz varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuzla konuşunuz. Bu ilaç enfeksiyonun yeniden aktive olmasına neden olabilir. Secukinumab tedavisi öncesinde ve sırasında doktorunuz sizi enfeksiyon bulguları açısından kontrol edebilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz: kötüleşen yorgunluk, ciltte veya gözlerin beyaz kısmında sararma, koyu renkli idrar, iştahsızlık, mide bulantısı ve/veya mide bölgesinin sağ üst tarafında ağrı.

### Enflamatuar bağırsak hastalığı (Crohn hastalığı ya da ülseratif kolit)

Karın krampları ya da karın ağrısı, ishal, kilo kaybı, dışkıda kan ya da bağırsak problemlerine işaret eden başka bir belirti fark ederseniz, VERXANT kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuza haber verin ya da tıbbi yardım alın.

Biyoteknolojik ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

VERXANT ile tedaviniz sırasında aşağıdaki semptomlardan herhangi biri sizde ortaya çıkarsa derhal tedaviyi durdurunuz ve doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

### Enfeksiyonlar ve alerjik reaksiyonlar

VERXANT, enfeksiyonlar ve alerjik reaksiyonlar dahil olmak üzere potansiyel olarak ciddi yan etkilere sebep olabilir. VERXANT kullandığınız süre boyunca bu rahatsızlıkların belirtilerine karşı dikkatli olmalısınız.

Bu tip işaretler bölüm 4 “Olası yan etkiler nelerdir?” başlığı altında listelenmektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **Çocuklar ve ergenler**

VERXANT, bu yaş grubunda çalışılmadığı için (18 yaşından küçük) çocuklara ve ergenlere önerilmemektedir.

### **VERXANT’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

VERXANT aç ya da tok karına uygulanabilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Gebelikte VERXANT kullanımı tercih edilmeyen bir durumdur. Bu ilacın gebe kadınlardaki etkileri bilinmemektedir. Eğer gebe kalma potansiyeli olan bir kadın iseniz, VERXANT kullandığınız süre boyunca ve son VERXANT dozundan itibaren en az 20 hafta süreyle yeterli doğum kontrol yöntemleri kullanmanız önerilir. Gebe iseniz, gebe kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız veya gebe kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuzla görüşünüz. Emzirip emzirmeyeceğinize ya da VERXANT kullanıp kullanmayacağınıza siz ve doktorunuz birlikte karar vermelisiniz. İkisini bir arada yapmamalısınız. VERXANT kullandıktan sonra, son dozdan itibaren en az 20 hafta emzirmemelisiniz.

### **Araç ve makine kullanımı**

VERXANT’ın araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur veya etkileri göz ardı edilebilir düzeydedir.

### **VERXANT’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Aşağıdaki durumlar sizin için geçerli ise doktorunuza söyleyiniz:

- Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız ya da alma olasılığınız varsa.
- Yakın zamanda aşı olduysanız ya da olacaksınız. VERXANT kullanırken belirli tip aşılardan (canlı aşılardan gibi) olmamanız gerekmektedir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. VERXANT nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Bu ilacı daima doktorunuzun size önerdiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız hallerde doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

VERXANT iğne yoluyla derinizin altına yapılır (deri altı enjeksiyonu olarak bilinir). VERXANT'ı kendi kendinize enjekte edip etmeyeceğinize siz ve doktorunuz karar vermelisiniz.

Bir doktor, hemşire ya da eczacı tarafından eğitim almadan kendi kendinize iğne yapmayı denememeniz önemlidir. Ayrıca size bakan kişi de uygun eğitimden sonra size VERXANT iğnesini yapabilir.

VERXANT'ın nasıl enjekte edileceği ile ilgili talimatlar için bu kullanma talimatının sonunda yer alan "Enjeksiyon kaleminin kullanım talimatları" başlığı altına bakınız.

VERXANT'a ne kadar ve ne süreyle ihtiyacınız olduğuna doktorunuz karar verecektir.

#### Plak psoriasis

##### *Yetişkin*

- Önerilen doz, deri altına iğne ile 300 mg'dır.
- 300 mg'lık her bir doz, **300 mg'lık bir iğne şeklinde verilir.**

İlk dozdan sonra size 1, 2, 3 ve 4. haftalarda haftalık ek iğneler yapılacaktır. Ardından aylık iğneler olacaksınız. İlaça karşı verdiğiniz yanıtınıza bağlı olarak, doktorunuz tarafından size verilecek olan dozunuzda ilave ayarlamalar önerilebilir. Bu uygulama zamanlarının her birinde size, 300 mg'lık bir iğne şeklinde verilen 300 mg'lık doz uygulanacaktır.

#### Psoriatik artrit

Eğer hem orta ila şiddetli plak psoriasis hem de psoriatik artrit hastalığına sahipseniz, doktorunuz doz önerisini gerektiği gibi ayarlayabilir.

Tümör nekroz faktörü (TNF) blokerleri adı verilen ilaçlara iyi yanıt vermeyen hastalar için:

- Önerilen doz deri altına iğne ile 300 mg'dır.
- 300 mg'lık her bir doz, **300 mg'lık bir iğne şeklinde verilir.**

İlk dozdan sonra size 1, 2, 3 ve 4. haftalarda haftalık ek iğneler yapılacaktır. Ardından aylık iğneler olacaksınız. Bu uygulama zamanlarının her birinde size, 300 mg'lık bir iğne şeklinde verilen 300 mg'lık doz uygulanacaktır.

#### Diğer psoriatik artrit hastaları için:

- Önerilen doz deri altına iğne ile 150 mg'dır.

İlk dozdan sonra size 1, 2, 3 ve 4. haftalarda haftalık ek iğneler yapılacaktır. Ardından aylık iğneler olacaksınız.

Yanıtınıza baęlı olarak, doktorunuz dozu 300 mg'a ıkarabilir.

Ankilozan spondilit (Radyografik aksiyal spondiloartrit)

- nerilen doz deri altına ięne ile 150 mg'dır.

İlk dozdan sonra size 1, 2, 3 ve 4. haftalarda haftalık ek ięneler yapılacaktır. Ardından aylık ięneler olacaksınız.

Yanıtınıza baęlı olarak, doktorunuz dozu 300 mg'a ıkarabilir. Her 300 mg'lık doz, 300 mg'lık bir ięne Őeklinde uygulanacaktır.

VERXANT uzun sreli bir tedavidir. Doktorunuz, tedavinin istenen etkiyi gsterip gstermedięini belirlemek zere durumunuzu dzenli olarak izleyecektir.

İęnelerinizin ve takip randevularınızın hangi tarihlerde olacaęı hakkında doktorunuzla grřtęnzden emin olunuz.

Doktorunuzun size syledięi sre boyunca VERXANT'ı kullanmaya devam ediniz.

**Uygulama yolu ve metodu:**

VERXANT'ın nasıl enjekte edileceęi ile ilgili talimatlar iin bu kullanma talimatının sonunda yer alan "Enjeksiyon kaleminin kullanım talimatları" bařlıęının altına bakınız.

**Deęişik yař grupları:**

**ocuklarda kullanımı:**

VERXANT'ın 18 yař altı ocuk hastalarda gvenlilik ve etkililięi henz arařtırılmadıęından bu yař grubundaki hastalarda nerilmemektedir.

**Yařlılarda kullanımı:**

VERXANT, 65 yař ve zeri hastalara herhangi bir doz ayarlaması gerekmeksizin kullanılabilir.

**zel kullanım durumları:**

**Bbrek yetmezlięi / karacięer yetmezlięi:**

VERXANT, bu hasta gruplarında arařtırılmamıřtır. Herhangi bir doz nerisinde bulunulamamaktadır.

*Eęer VERXANT'ın etkisinin ok gl veya zayıf olduęuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla VERXANT kullandıysanız:**

*VERXANT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmıřsanız veya doz, doktorunuzun reete ettięinden daha yakın zamanda uygulandıysa, bir doktor veya eczacı ile konuřunuz.*

**VERXANT'ı kullanmayı unutursanız**

VERXANT ięnenizi yapmayı unutursanız, doktorunuzla grřnz.

*Unutulan dozları dengelemek iin ift doz almayınız.*

## **VERXANT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

VERXANT kullanmayı bırakmak tehlikeli değildir. Eğer bırakırsanız, psoriasis, psoriatik artrit veya ankilozan spondilit ile ilgili şikayetleriniz tekrar oluşabilir.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi VERXANT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Çok yaygın         | :10 hastanın en az 1'inde görülebilir.   |
| Yaygın             | :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.       |
| Yaygın olmayan     | :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.    |
| Seyrek             | :1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. |
| Çok seyrek         | :10.000 hastanın birinden az görülebilir.                                      |
| Sıklığı bilinmeyen | :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.             |

**Aşağıdakilerden biri olursa, VERXANT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

**Ciddi alerjik reaksiyon** - işaretleri aşağıdakileri içerebilir:

- Nefes alma ve yutma güçlüğü
- Düşük kan basıncı: Sersemlik haline veya baş dönmesine yol açabilir
- Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişlik
- Kırmızı deri döküntüsü veya kabarıklıkların eşlik ettiği şiddetli deri kaşıntısı

**Olası ciddi enfeksiyon** - işaretleri aşağıdakileri içerebilir:

- Ateş, grip benzeri semptomlar, gece terlemeleri
- Yorgunluk veya nefessizlik hissi; geçmeyen öksürük
- Ciltte sıcaklık hissi, kızarıklık ve ağrı veya ağrılı kabarcıklı deri döküntüsü
- İdrara çıkarken yanma hissi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VERXANT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

### **Diğer yan etkiler:**

Yan etkiler aşağıda listelenmektedir. Yan etkilerin çoğu hafif ila orta derecelidir. Eğer bu yan etkiler ciddileşirse lütfen doktorunuza, eczacınıza veya sağlık kuruluşunuza bildiriniz.

### **Çok yaygın:**

- Boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı gibi semptomlarla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları (nazofarenjit, rinit)

### **Yaygın:**

- Uçuk (oral herpes)
- İshal
- Burun akıntısı (rinore)
- Baş ağrısı
- Mide bulantısı
- Yorgunluk
- Kaşıntılı, kızarıklık ve kuru cilt (egzama)

**Yaygın olmayan:**

- Ağızda pamukçuk (oral kandidiyazis)
- Düşük beyaz kan hücresi düzeyine bağlı ateş, boğaz ağrısı ve ağız ülserleri gibi enfeksiyon belirtileri (nötropeni)
- Dış kulak enfeksiyonu (otitis eksterna)
- Gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve şişme ile birlikte göz akıntısı (konjunktivit)
- Kaşıntılı döküntü (ürtiker)
- Alt solunum yolu enfeksiyonu
- Karında kasılmalar ve ağrı, ishal, kilo kaybı ve dışkıda kan olması (bağırsak hastalığı şikayetleri)
- Avuç içlerinde, ayak tabanlarında ve el ve ayak parmaklarının kenarlarında küçük, kaşıntılı kabarcıklar (dishidrotik egzama)
- Ayakta mantar hastalığı (tinea pedis)

**Seyrek:**

- Şokun eşlik ettiği şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon)
- Vücutta geniş alanları kapsayan kaşıntılı ve ağrılı kızarıklıkların ve döküntülerin olması (eksfolyatif dermatit)
- Küçük kırmızı veya mor şişlikler ile deri döküntüsüne yol açabilen küçük kan damarlarının iltihabı(vaskülit)
- Boyun, yüz, ağız veya boğazda yutkunma veya nefes alma güçlüğüne yol açabilecek şişme (anjioödem)

**Sıklığı bilinmeyen:**

- Cilt ve mukoza üzerinde mantar enfeksiyonları (yemek borusunu tutan mantar enfeksiyonu (özefageal kandidiyazis) dahil)
- Ağrılı şişlik ve cilt ülserasyonu (piyoderma gangrenosum)

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. VERXANT’ın saklanması**

*VERXANT’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

Enjeksiyon kalemini, ışıktan korumak için tamamen kapalı kutusu içinde tutunuz.

Buzdolabında 2 °C- 8 °C arasında tutunuz. Dondurmayınız. Çalkalamayınız.

Gerekirse, bir kereye mahsus olarak, VERXANT buzdolabının dışında, 30°C’yi geçmeyen oda sıcaklığında 4 güne kadar bekleyebilir.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VERXANT’ı kullanmayınız.*



Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, sıvı kolaylıkla görülebilir parçacıklar içeriyorsa, bulanıksa ve belirgin şekilde kahverengi ise VERXANT'ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Ruhsat sahibi:** Farmanova Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi  
Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak  
Nidakule, No:7/3f, İç Kapı No:27  
Ataşehir / İstanbul

**Üretim yeri:** Novartis Pharma Stein AG,  
Schaffhauserstrasse, 4332 Stein AG, İsviçre

*Bu kullanma talimatı 07/03/2025 tarihinde onaylanmıştır.*

## Enjeksiyon kaleminin kullanım talimatları

İğneyi yapmadan önce bu talimatları sonuna kadar okuyunuz.



Bu talimatlar, VERXANT enjeksiyon kalemini kullanarak doğru şekilde iğne yapmanızda size yardımcı olma amaçlıdır.

Bir doktor, hemşire veya eczacı tarafından eğitime kadar kendinize iğne yapmamanız önemlidir.

### VERXANT enjeksiyon kaleminiz:




|   |   |
|---|---|
|  <p>Resimde kapağı çıkarılmış VERXANT kalem görülüyor. Enjeksiyona hazır olana kadar kapağı <b>çıkarmayınız</b>.</p> | <p>Kutusu içindeki VERXANT enjeksiyon kaleminizi <b>buzdolabında</b>, 2°C ila 8°C arasında ve <b>çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kalemi <b>dondurmayınız</b>.</li><li>• Kalemi <b>çalkalamayınız</b>.</li><li>• Eğer kapağı çıkarılmış vaziyette <b>düşürülmüş</b> ise, kalemi kullanmayınız.</li></ul> <p>İğne, iğne muhafazası ile örtülüdür ve iğne görünmeyecektir. İğne muhafazasına dokunmayınız veya iğneyi itmeyiniz çünkü iğne batması sonucu yaralanabilirsiniz.</p> |
|---|---|

### İğneyi yapmak için gerekenler:



|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Kutu içinde olanlar:</p> <p>Yeni ve önceden kullanılmamış VERXANT kalem</p>  | <p>Kutu içinde olmayanlar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alkollü bez</li><li>• Pamuk topları veya gazlı bez</li><li>• Kesici/delici alet kabı</li></ul> |  |
|--|---|---|

## İğneyi yapmadan önce:

Oda sıcaklığına ulaşmasını sağlamak üzere kalemi, **iğneyi yapmadan 30-45 dakika önce** buzdolabından çıkarınız.

|   |  |
|---|--|
|    | <p><b>1. İğneyi yapmadan önceki önemli emniyet kontrolleri:</b><br/>Sıvı, berrak olmalıdır. Rengi, renksiz ile hafif sarı arasında değişebilir.<br/>Eğer sıvı içinde kolaylıkla görülebilen parçacıklar varsa, bulanık ise veya belirgin şekilde kahverengi ise, <b>kullanmayınız.</b></p> <p><b>Son kullanma tarihi</b> geçmiş ise kalemi <b>kullanmayınız.</b><br/><b>Emniyet mührü</b> kırılmış ise <b>kullanmayınız.</b></p> <p>Enjeksiyon kaleminizin doğru ilacı ve dozu içerip içermediğini kontrol ediniz.</p> <p>Kalem bu kontrollerden herhangi biri için uygunsuz sonuç verirse, eczacınızla görüşünüz.</p>   |
|  | <p><b>2a. İğne yerinizi seçin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Önerilen bölge, uyluklarınızın ön kısmıdır. Ayrıca alt karnı da kullanabilirsiniz fakat göbek deliğinin 5 cm çevresindeki alanı <b>kullanmamalısınız.</b></li><li>• Kendinize her iğne yaptığımızda farklı bir yeri seçiniz.</li><li>• Cildin hassas, bereli, kırmızı, pullu ya da sert olduğu alanlara iğne yapmayınız. Yara ve deri çatlağı izlerinin olduğu alanlardan kaçınınız.</li></ul> <p><b>2b. Sadece bakıcılar ve sağlık uzmanları için:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eğer size iğnenizi bir <b>bakıcı</b> veya <b>sağlık uzmanı</b> yapıyorsa, dış üst kolunuza da iğne yapabilir.</li></ul> |
|  | <p><b>3. İğne yerinin temizlenmesi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ellerinizi sabun ve sıcak su ile yıkayınız.</li><li>• Dairesel hareketler kullanarak iğne yapacağınız yeri alkollü bez ile temizleyiniz. İğneden önce kurumaya bırakınız.</li><li>• İğneden önce temizlenen bölgeye tekrar dokunmayınız.</li></ul>   |

### İğnenin hazırlanması:




### 4. Kapağın çıkarılması:

- Kapağı sadece kalemi kullanmaya hazır olduğunuzda çıkarınız.
- Kapağı, soldaki şekilde gösterildiği gibi ok yönünde çekip açınız.
- Çıkardıktan sonra kapağı atınız. **Kapağı yeniden takmaya çalışmayınız.**
- Kapağı çıkardıktan sonraki 5 dakika içerisinde kalemi kullanınız.

### 5. Kalemin tutuluşu:

- Kalemi, temizlenen iğne yapacağınız yere dik olacak (90 derece açı) şekilde tutunuz.



Doğru

Yanlış




### İĞNEYİ YAPMADAN ÖNCE BU BÖLÜMÜ OKUMALISINIZ.

İğne esnasında **iki tık sesi** duyacaksınız.


Birinci **tık sesi**, iğnenin başladığı anlamına gelir. Birkaç saniye sonra duyacağınız **ikinci tık sesi**, iğnenin **neredeyse** tamamlandığı anlamına gelir.

Pencereyi dolduran **yeşil işareti** görene ve hareketi durana kadar VERXANT kalemi cildinize doğru sıkıca tutmaya devam etmelisiniz.



### 6. İğneye başlama:


- İğneye başlamak için kalemi cildinize doğru sıkıca bastırın.
- Birinci **tık sesi**, iğnenin başladığı anlamına gelir.
- Kalemi cildinize doğru sıkıca **tutmaya devam edin.**
- **Gri uçlu yeşil işaret**, iğnenin gidişatını gösterir.



#### 7. İğnenin tamamlanması:


- **İkinci tık sesini** duyana kadar bekleyin. Bu ses, iğnenin **neredeyse** tamamlandığı anlamına gelir.
- **Gri uçlu yeşil işareti** kontrol edin: pencereyi doldurmalı ve artık hareket etmemelidir.
- Kalem artık çıkarılabilir.

#### İğneden sonra:



#### 8. Yeşil işaretin pencereyi doldurup doldurmadığını kontrol edin:

- Doldurmuş olması, ilacın uygulanmış olduğu anlamına gelir. Yeşil işaret görünmüyorsa doktorunuzla görüşün.
- İğne yerinde az miktarda kan olabilir. İğne yapılan yerin üzerine pamuk parçası veya gazlı bez bastırıp 10 saniye tutabilirsiniz. İğne yapılan yeri ovalamayınız. Gerekirse iğne yerini küçük bir yara bandı ile örtebilirsiniz.



#### 9. Verxant UnoReady kaleminizin atılması:

- Kullanılan kalemi, kesici/delici aletler kutusu (örn., delinmeye dirençli kapaklı kap veya benzeri) içine atınız.
- Kalemi tekrar kullanmaya kesinlikle kalkışmayınız.